

Sorbonne Université
LU2MA260 - Séries numériques et séries de fonctions

Contrôle Continu 2

Durée : 1h15

Instructions : Ecrivez votre nom, prénom et numéro d'étudiant. La qualité de la rédaction sera largement prise en compte. **Hormis les questions de cours, toutes les réponses doivent être justifiées**. Ecrire au crayon à papier est autorisé.

Le barème est à titre indicatif.

Question de cours [3 points]

Dans tous l'exercice, sauf mention contraire, f est une fonction définie sur \mathbb{R} , périodique de période 2π , intégrable sur $[0, 2\pi]$.

1. Donne l'expression générale de la série trigonométrique (aussi appelée série de Fourier) de f , par ses coefficients trigonométriques, puis par ses coefficients exponentiels.
2. Rappeler les formules pour calculer les coefficients de Fourier trigonométriques et exponentiels de f .
3. Rappeler le lien entre coefficients trigonométriques et exponentiels d'une série de Fourier.
4. Rappeler le théorème de Parseval.
5. Soit f une fonction définie sur \mathbb{R} , périodique de période 2π , intégrable sur $[0, 2\pi]$ et (c_n, a_n, b_n) ses coefficients de Fourier ($(c_n)_n$ sont les coefficients exponentiels).
 - a) Que dire des coefficients quand f est pair ?
 - b) Que dire des coefficients quand f est impair ?
 - c) Que dire des coefficients quand f est à valeur réelle ?

Exercice 1 [3 points]

Déterminer la série de Fourier de la fonction périodique de période 2π définie par $f(x) = x^2$ pour $-\pi \leq x \leq \pi$. En déduire la somme des séries $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}$.

Exercice 2 [5 points]

1. Donner la décomposition en série de Fourier de la fonction f définie par $f(x) = \cos(5x)$.
2. En utilisant le théorème de Parseval, prouver que deux fonctions continues 2π périodiques ayant les mêmes coefficients de Fourier sont égales.
3. Soit f une fonction continue 2π -périodique. Montrer que $(c_n(f))$ tend vers 0 lorsque $|n|$ tend vers $+\infty$.
4. Soit f la fonction "créneau" définie par $f(x) = 1$ si $x \in [0, \pi[$, $f(x) = -1$ si $x \in [-\pi, 0[$, et prolongée par 2π -périodicité. Quelle est la régularité de cette fonction ? Que dire de la série de Fourier de f en 0 ? Peut-on avoir convergence normale de la série de Fourier de f vers f sur $[-\pi, \pi]$?
5. Soit f la fonction paire 2π -périodique définie par $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, \pi]$. f est-elle C^1 par morceaux ?